



Samtykkeerklæring og information om behandling med Restylane Produkter

Fillerprodukter

Restylaneprodukterne er sterile geler, der består af vand, stabiliseret hyaluronsyre og 0,3 % Lidocain, som er en lokalbedøvelse.

De injiceres i huden for at korrigere linjer, rynker og folder i ansigtet, forstørre læberne og danne ansigtskonturer. De bruges også til at genoprette hudens elasticitet og reducere uregelmæssigheder i hudens overflade.

En behandling giver et langvarigt, men ikke permanent resultat. Vi forventer en holdbarhed på 6-12 måneder i huden og 3-6 måneder i læberne. Der anbefales en kontrol ca. 14 dage efter behandlingen med henblik på en eventuel opfølgende behandling, hvorved resultatet holder længere.

Normale reaktioner umiddelbart efter behandlingen

Der ses sædvanligvis mindre rødme, ømhed, hævelse og kløe i det behandlede område. Der kan opstå enkelte blå mærker, og der er rapporteret små buler. Alle gener forsvinder som regel efter et par dage. Der anbefales Epidermal Repair fra SkinCeuticals til at mindske generne og reducere rødmen.

Ved læbeforstørrelse vil der være hævelse i et par dage, og hos nogle få kan hævelsen vare op til en uge. Læberne kan være lidt ujævne i den periode således, at det umiddelbare resultat ikke er det endelige resultat. Nogle har haft gavn af at tage antihistamin, der kan købes i håndkøb.

Forsigtighedsregler

Behandling med filler (Restylane produkter) gives ikke til:

- Gravide
- Ammende
- Ved aktiv hudsygdom i området
- Hvis tidligere behandlet med permanente fillere i området

Derudover gøres opmærksom på, at vi ikke behandler med hyalase (enzym der opløser hyaluron i filler) på kosmetisk indikation, hvis man er allergisk overfor bi eller hveps, medmindre der er lavet forudgående allergitest for bi og hveps samt hyalase.

Komplikationer

I sjældne tilfælde er der rapporteret:

- Lette til moderate betændelsesreaktioner, som er opstået dage eller uger efter behandlingen.
- Langvarig hærdelse, pusdannelse og grålig misfarvning ved behandlingsstedet.
- Pludselig opstået smerte som følge af påvirkning af blodkar til et område samt sårskorper og dødt væv ved behandlingsstedet, som kan medføre en overfladisk ardannelse.
- Under øjnene kan der forekomme langvarig hævelse.
- Betændelsesreaktioner opstået 1-2 måneder efter behandlingen.

I ekstremt sjældne tilfælde er der på verdensplan rapporteret tilfælde med blindhed ved indsprøjtning med filler.

Hvis der, mod forventning, skulle opstå nogen af de ovennævnte komplikationer, eller andet, der bekymrer dig, er det VIGTIGT, at du kontakter klinikken med det samme på vores AKUT-telefon, da vi har den nødvendige ekspertise og læger

til at håndtere sådanne situationer. Jo hurtigere man kommer i behandling, jo bedre, og vi vil hellere have en opringning for meget end en for lidt.

Det er muligt at opløse fillerens, hvis der mod forventning skulle opstå et uønsket resultat.

AKUT-telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959.

Husk efter behandlingen:

- Undgå store temperaturforskelle i et par dage, dvs. solarium og sauna, samt hård træning den første dag.
- Undgå at røre de behandlede områder i seks timer og brug ikke makeup samme dag.
- Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større tendens til blå mærker. Det anbefales at holde pause med fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Hvis du tidligere har haft et forkølelsessår, er der en risiko for, at kanylehullerne kan fremprovokere et nyt udbrud. Der anbefales tbl. Valaciclovir, som fås på recept hos egen læge.
- Undgå at plukke hår i det område, hvor behandlingen udføres, samme dag.

Klinikken kan kontaktes ved spørgsmål på tlf. 7027 3366 og efter lukketid på tlf. 3160 9959.

Information og samtykke

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med fillerprodukter.

Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål. Jeg har haft to dages betænkningstid inden min behandling.

Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.

Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.

N'AGE, den _____

Navn (blokbogstaver)

Underskrift

Revideret nov. 2025 / CZ / Næste revidering dec. 2027

The following is an English translation of "Samtykkeerklæring og information om behandling med Restylane Produkter". The English translation below serves for information purposes only. In case of differences, the Danish version prevails. Signature is required on the Danish version and is only valid as such

Declaration of Consent and Information about Treatment with Restylane Products

Filler Products

Restylane products are sterile gels consisting of water, stabilized hyaluronic acid and 0.3% Lidocaine, which is a local anesthetic.

Restylane is injected into the skin to correct lines, wrinkles and folds on the face, enlarge the lips and form facial contours. They are also used to restore skin elasticity and reduce irregularities in the skin's surface.

The treatment gives a long-lasting but not permanent result. The result is expected to last 6-12 months for treatment on the skin and 3-6 months for treatment on the lips. A follow-up appointment is recommended approx. 14 days after the treatment with a possible follow-up treatment with which the result lasts longer.

Normal Reactions Immediately after Treatment

There is usually some redness, soreness, swelling and itching in the treated area. Some bruising and bumps may occur. All discomfort usually disappears after a few days. Epidermal Repair from SkinCeuticals is recommended to reduce discomfort and reduce redness.

With lip augmentation you will experience swelling for a few days. In some cases, the swelling can last up to a week. The lips may be slightly uneven during that period. The immediate result is not the final result. Some may have benefited from taking an over-the-counter antihistamine.

Precautions

Treatment with fillers (Restylane products) is not given to:

- When pregnant
- When breastfeeding
- In case of active skin disease in the area
- If previously treated with permanent fillers in the area

In addition, please note that we do not treat with hyalase (an enzyme that dissolves hyaluronic in filler) for cosmetic indications if you are allergic to bees or wasps, unless a prior allergy test for bees and wasps as well as hyalase has been carried out.

Complications

In rare cases, there have been reports of:

- Mild to moderate inflammatory reactions occurring days or weeks after treatment.
- Prolonged hardening, discharge and greyish discoloration in the treated area.
- Sudden pain as a result of the impact on blood vessels to/from an area, as well as scabs and dead tissue at the treated area can lead to superficial scarring.
- Prolonged swelling may occur under the eyes.
- Inflammatory reactions occurring 1-2 months after the treatment.

In extremely rare cases blindness from filler injections has been reported worldwide.

If, contrary to expectations, any of the above complications should arise or anything else should worry you, it is IMPORTANT that you contact the clinic immediately on our EMERGENCY phone since we have the necessary expertise and

doctors to handle such situations. The sooner you receive treatment, the better, and we would rather have too many calls than too few.

It is possible to dissolve the filler if, contrary to expectations, an undesirable result should occur.

The EMERGENCY phone is always open and can also be reached outside office hours: +45 3160 9959.

Remember after the Treatment:

- Avoid large temperature differences for a few days, i.e. solarium and sauna, as well as hard exercise on the first day.
- Avoid touching the treated areas for 6 hours and do not use make-up on the same day.
- If you take medicines with acetylsalicylic acid (e.g. Kodimagnyl, Hjertemagnyl or Treo) you will have an increased tendency to bruise. It is recommended to take a break with fish oil a few days before and after the treatment.
- If you have previously had a cold sore, there is a risk that the needle holes may provoke a new outbreak. In that case, it is recommended to take Valaciclovir which is available on prescription from your doctor.
- Avoid picking hair the same day in treated area.

The clinic can be contacted for questions on tel. +45 7027 3366 and after office hours on tel. +45 3160 9959.

Information and Consent

I have been informed about the effects, reactions, side effects and possible complications in connection with treatment with filler products.

My medical aesthetic professional has given me the opportunity to ask questions, and I have had the opportunity to bring a companion to the consultation. I have received satisfactory answers to my questions. I have had 2 days' time to reflect before my treatment.

I have answered the questions about my medical history honestly.

I hereby give my permission to be treated.